

Td 4

1) Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$ et f un endomorphisme de E .

Montrer qu'il existe un automorphisme g et un projecteur p tel que $f = g \circ p$.

2) Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \left(1 - t \arctan\left(\frac{1}{t}\right)\right) dt$ converge et donner sa valeur.

3) On note $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$).

On suppose que F est un hyperplan stable par multiplication. On souhaite montrer par l'absurde que $I_n \in F$.

On suppose que $I_n \notin F$, et on note p la projection sur $\text{vect}(I_n)$ parallèlement à F .

- a) Montrer que : $\forall M, M' \in E, p(M).p(M') = p(MM')$.
- b) En déduire que : $\forall M \in E, (M^2 \in F \Rightarrow M \in F)$.
- c) Établir que F contient la base canonique de E .
- d) Conclure.

4) On pose : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = nx^3 + n^2x - 2$.

- a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists! a_n > 0 : f_n(a_n) = 0$.
- b) Étudier la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et calculer sa limite.
- c) La série $\sum a_n$ converge-t-elle ?
- d) Étudier la série $\sum n^\alpha \left(a_n - \frac{2}{n^2}\right)$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$.

5) Soit $f : x \mapsto \int_x^{2x} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{t} dt$.

- a) Montrer que f est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et calculer f' .
- b) Déterminer $\lim_{0^+} f$ et $\lim_{+\infty} f$.

Td 4

1) Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$ et f un endomorphisme de E .

Montrer qu'il existe un automorphisme g et un projecteur p tel que $f = g \circ p$.

2) Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \left(1 - t \arctan\left(\frac{1}{t}\right)\right) dt$ converge et donner sa valeur.

3) On note $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$).

On suppose que F est un hyperplan stable par multiplication. On souhaite montrer par l'absurde que $I_n \in F$.

On suppose que $I_n \notin F$, et on note p la projection sur $\text{vect}(I_n)$ parallèlement à F .

- a) Montrer que : $\forall M, M' \in E, p(M).p(M') = p(MM')$.
- b) En déduire que : $\forall M \in E, (M^2 \in F \Rightarrow M \in F)$.
- c) Établir que F contient la base canonique de E .
- d) Conclure.

4) On pose : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = nx^3 + n^2x - 2$.

- a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists! a_n > 0 : f_n(a_n) = 0$.
- b) Étudier la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et calculer sa limite.
- c) La série $\sum a_n$ converge-t-elle ?
- d) Étudier la série $\sum n^\alpha \left(a_n - \frac{2}{n^2}\right)$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$.

5) Soit $f : x \mapsto \int_x^{2x} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{t} dt$.

- a) Montrer que f est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et calculer f' .
- b) Déterminer $\lim_{0^+} f$ et $\lim_{+\infty} f$.